

Příbalová informace - VP

Informace pro použití, čtěte pozorně

OPHTHALMO-SEPTONEX

(Carbethopendeciniu bromidum)

oční mast

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zentiva, k.s., Praha, Česká republika

Složení

Léčivá látka: Carbethopendeciniu bromidum 5 mg v 5 g oční masti

Pomocné látky: oční bílá vazelína, tuk z ovčí vlny (lanolin), bílý vosk, čištěná voda

Indikační skupina

Oftalmologikum, antiseptikum

Charakteristika

Oční mast Ophthalmo-Septonex má dezinfekční vlastnosti a je proto vhodná pro léčbu nehnisavých zánětů předního úseku oka.

Indikace

Ophthalmo-Septonex se používá u dospělých i dětí při zánětech víček a spojivek, při poškození rohovky po vyjmutí cizích tělísek a po úrazech.

Při závažnějších, zejména hnisavých zánětech, je nutné vyhledat lékaře.

Kontraindikace

Přecitlivělost na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku, dále při snížené tvorbě slz a při zánětech rohovky a spojivky s omezeným vylučováním slz.

Těhotenství a kojení

Přípravek je možno použít krátkodobě i v těhotenství a při kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Pozornost není použitím oční masti Ophthalmo-Septonex ovlivněna, rozhodující je postižení zraku.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i oční mast Ophthalmo-Septonex nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Po vnesení do spojivkového vaku může oční mast u citlivějších pacientů vyvolat přechodný pocit pálení nebo může dojít ke zčervenání kůže víček.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce

Vzájemné ovlivnění účinku oční masti Ophthalmo-Septonex a jiných očních mastí není známo. Přesto bez porady s lékařem nepoužívejte současně s touto mastí jiné volně prodejné oční přípravky. Jestliže Vám oční lékař bude předepisovat nějaké jiné léky, oznamte mu, že používáte oční mast Ophthalmo-Septonex.

Dávkování a způsob použití

Obvykle se u dospělých i dětí vnáší do spojivkového vaku nebo nanáší na kůži víček malé množství oční masti 3-5x denně maximálně po dobu 14 dnů. Při současné léčbě očními kapkami se mast používá obvykle na noc.

Je vhodné po vnesení masti do oční štěrbiny nechat zavřené oko na 2 - 3 minuty, aby léčivá látka neodtekla se slzami a mohla se vstřebat rohovkou a spojivkou. Při používání dvou či více očních mastí je nutné mezi jejich použitím nechat uplynout alespoň 10 minut.

Před prvním použitím se doporučuje vytlačit a odstranit asi 1 cm masti.

Upozornění

Jestliže se během 3 dnů léčby Vaše obtíže výrazně nezlepší nebo se dokonce zhorší nebo se vyskytnou u Vás neobvyklé reakce, porad'te se s lékařem.

Při závažných poraněních oka se o použití přípravku porad'te s lékařem.

Při náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře.

Uchovávání

Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem.

Varování

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Doba použitelnosti po prvním otevření jsou 4 týdny.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení

5 g oční masti

Datum poslední revize

4.9.2009